

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

### **SULPHODENT 370mg/g**

360mg/g woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa +10mg/g bocheńska  
lecnicza sól jodkowo-bromowa  
**pasta do zębów**

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulphodent
3. Jak stosować lek Sulphodent
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Sulphodent
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1.Co to jest lek Sulphodent i w jakim celu się go stosuje?**

Mineralna pasta do zębów Sulphodent zawiera w swoim składzie aktywne biologicznie związki siarki  $S^{2-}$ ,  $HS^-$  oraz jony  $Cl^-$ ,  $K^+$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$ ,  $HCO_3^-$ ,  $J^-$ ,  $Br^-$ . Zawarty w paście chlorek sodowy wykazuje działanie antyseptyczne, działa pobudzająco na błonę śluzową i zwiększa wydzielanie śliny. Mineralne składniki pasty działają ściągająco i przeciwzapalnie, wpływają na odnowę i regenerację nabłonka śluzówki jamy ustnej.

Stosowanie pasty zmniejsza krwawienia i obrzęk brodawek dziąsłowych, obniża ilość wydzielanego płynu z kieszonek dziąsłowych i zmniejsza głębokość patologicznych kieszonek dziąsłowych. Nie zaostrza procesu zapalnego w przyzębiu.

#### **Wskazania:**

- zapalenie przyzębia (tzw. paradontoza)
- zapalenie dziąseł
- profilaktyka chorób przyzębia

## **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sulphodent**

### **Kiedy nie stosować Sulphodentu:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) w tym metylu parahydroksybenzoesan,
- w ropnych stanach zapalnych przyzębia

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed rozpoczęciem stosowania Sulphodentu należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli po upływie 10-15 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

### **Dzieci**

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku u dzieci.

### **Lek Sulphodent, a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

Lek Sulphodent nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

## **3. Jak stosować lek Sulphodent?**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2-3 razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów przez około 2-3 minuty. Po umyciu dokładnie wypłukać.

### **W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana**

Nie są znane objawy przedawkowania.

### **W przypadku pominięcia dawki leku Sulphodent**

Należy zastosować kolejną dawkę pasty, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek Sulphodent może powodować działania niepożądane. Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

#### **Zgłaszanie działań niepożądanych.**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309,

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

#### **5. Jak przechowywać lek Sulphodent**

Przechowywać w temp. do 25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować Sulphodentu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

##### **Co zawiera lek Sulphodent**

*Substancje czynne* leku: woda chlorkowo-sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa oraz bocheńska lecznicza sól jodkowo-bromowa

*Substancje pomocnicze* to: krzemionka, glicerol 85% , guma ksantanowa, olejek mięty pieprzowej, siarczan laurylo -sodowy, sorbitol, dwutlenek tytanu, sacharoza, metylu hydroksybenzoesan.

##### **Jak wygląda lek Sulphodent i co zawiera opakowanie**

SULPHODENT jest pakowany w tuby o zawartości netto 60g pasty.

Tuba wraz z ulotką informacyjną umieszczona jest w opakowaniu zewnętrznym – kartoniku .

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”  
28-100 Busko- Zdrój , ul. Rokosza 18  
tel/fax 0-41 378-48-88; 041-378-78-93  
e-mail: [kontakt@sulphur.com.pl](mailto:kontakt@sulphur.com.pl)